

# ۱. سیلدنافیل (Sildenafil)

## دوزاژ:



۲۵  
۵۰  
۱۰۰  
میلی‌گرم  
(یک ساعت قبل از رابطه)

## اسم تجاری:


۱. ویاگرا (Viagra)  
• شرکت سازنده: Pfizer (آمریکا)
۲. ویزارسین (Vizarsin)  
• شرکت سازنده: KRKA (اسلوانی)
۳. ارکتو ۱۰۰ (Erecto 100)  
• شرکت سازنده: Cipla

## عوارض جانبی:



سردرد،  
گرگرفتگی،  
سوءهاضمه، احتقان بینی،  
تغییرات بینایی  
(مثل دید آبی‌رنگ)

## مدت اثرگذاری:



۴ تا ۶ ساعت

## زمان شروع اثر:



۳۰ تا ۶۰ دقیقه

## چه کسانی نباید مصرف کنند:

مصرف هم‌زمان با نیترات‌ها،  
بیماری‌های قلبی شدید، فشار خون  
پایین، نارسایی کلیوی و کبدی شدید

# ۲. تادالافیل (Tadalafil)

## دوزاژ:




۵ ،  
۱۰ ،  
۲۰ و  
میلی گرم

## اسم تجاری:


- سیالیس (Cialis) . شرکت الی لیلی (Eli Lilly & Co)
- تادارکتیل (Tadarctil) . شرکت داروسازی روز دارو
- تیافیل (Tiafil) . شرکت داروسازی اسوه
- تیاگریکس (Tiagriss) . شرکت داروسازی کیمیدارو
- تاداکیم (Tadakim) . شرکت داروسازی کیمیا آرا
- پروسیال (Procial) . شرکت داروسازی مفید فارما

## عوارض جانبی:



- سردرد
- گرگرفتگی (احساس گرما و قرمزی در صورت و بدن)
  - سوءهاضمه و مشکلات گوارشی
  - احتقان بینی
  - درد عضلانی یا کمردرد
  - سرگیجه و احساس سبکی سر
- عوارض نادر ولی جدی:
- کاهش ناگهانی فشار خون (به ویژه در صورت مصرف همزمان با داروهای نیتراتی)
  - تعویض طولانی مدت و دردناک
  - تغییرات بینایی

## مدت اثر گذاری:



۱۷ تا ۳۶ ساعت

## زمان شروع اثر:



۳۰ تا ۴۵ دقیقه

## چه کسانی نباید مصرف کنند:

بیماری های شدید کلیوی یا کبدی، اختلالات بینایی خاص مانند نوروپاتی اپتیک ایسکمیک غیرشریانی (NAION)، اختلالات خونی خاص مانند کم خونی داسی شکل و لوسمی، و افرادی که حساسیت به تادالافیل یا ترکیبات آن دارند، مصرف این دارو منع است

تادالافیل نباید در افراد با مصرف همزمان نیترات ها (مثل نیتروگلیسرین) استفاده شود چون خطر افت شدید فشار خون وجود دارد. همچنین برای بیماران با بیماری های قلبی شدید (مثل سکته قلبی یا مغزی اخیر، آتژین ناپایدار)، فشار خون نامتعادل (خیلی بالا یا خیلی پایین)،

## ۳. واردنافیل (Vardenafil)

### دوزاژ:



۲/۵  
۵  
۱۰  
۲۰  
میلی گرم

### اسم تجاری:

واردنافیل (Vardenafil) توسط شرکت Bayer (بایر آلمان) تولید شده است. این دارو در بازار جهانی با نام‌های تجاری Levitra (لویترا) و Staxyn (استاکسین) عرضه می‌شود.

### عوارض جانبی:



عوارض شایع شامل سردرد، گرگرفتگی، سوءهاضمه، احتقان بینی و سرگیجه است. در موارد نادر، ممکن است تغییرات بینایی یا شنوایی، درد قفسه سینه یا نعوظ طولانی‌مدت (پریاپیسم) رخ دهد.

### مدت اثرگذاری:



۴ تا ۶ ساعت

### زمان شروع اثر:



۳۰ تا ۶۰ دقیقه

### چه کسانی نباید مصرف کنند:

واردنافیل نباید در افرادی که از نیترات‌ها یا داروهای آزادکننده نیتریک اکسید استفاده می‌کنند، مصرف شود، زیرا ممکن است منجر به کاهش شدید فشار خون شود. همچنین، در صورت داشتن مشکلات قلبی، فشار خون پایین، نارسایی کبدی یا کلیوی شدید، یا سابقه سکته مغزی یا قلبی، قبل از مصرف با پزشک مشورت کنید.

# ۴. آوانافیل (Avanafil)

## دوزاژ:



۵۰ ،  
۱۰۰ ،  
۲۰۰  
میلی گرم

## اسم تجاری:

این دارو با نام تجاری استندرا (Stendra) توسط شرکت متاوالنت فارما (Metaventon Pharma) تولید می‌شود.

## عوارض جانبی:



سردرد،  
گرگرفتگی،  
احتقان بینی  
و سرگیجه

## مدت اثرگذاری:



۶ تا ۱۲ ساعت

## زمان شروع اثر:



۱۵ تا ۳۰ دقیقه  
(سریع تر از بقیه داروها)

## چه کسانی نباید مصرف کنند:

مصرف هم‌زمان با نیترات‌ها، نارسایی شدید کلیوی و کبدی، نارسایی قلبی و سابقه سکته های قلبی وسیع

PDE5i

## جدول مقایسه ای داروهای اختلال نعوظ

آوانافیل	واردنافیل	نام دارو	تادالافیل	سیلدینافیل
- استندرا	- لویترا - استاکسین	اسم تجاری	- سیالیس - تاداگرا - تیافیل - تاداکیم - پروسیال	- ویگرا - ویزارسین - ارکتو
۲۰۰، ۱۰۰، ۵۰ میلی گرم	۲۰، ۱۰، ۵، ۲/۵ میلی گرم	دوز دارو	۲۰، ۱۰، ۵ میلی گرم	۱۰۰، ۵۰، ۲۵ میلی گرم
۱۵ تا ۳۰ دقیقه	۳۰ تا ۶۰ دقیقه	زمان شروع اثر	۳۰ تا ۴۵ دقیقه	۳۰ تا ۶۰ دقیقه
۶ تا ۱۲ ساعت	۴ تا ۶ ساعت	مدت اثر گذاری	۱۶ تا ۳۶ ساعت	۴ تا ۶ ساعت
گر گرفتگی احتقان بینی سرگیجه	سردرد گر گرفتگی سرگیجه	عوارض جانبی	گر گرفتگی سو هاضمه درد عضلانی	سردرد تاری دید گر گرفتگی